

LINHA

# SAÚDE AMBIENTAL



CIPERMETRINA HIGH-CIS

MARCA COMERCIAL:

Ciperprag<sup>®</sup> 250 CE

REGISTRO NO MS:

3.1606.0046.001-7

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Cipermetrina (Cypermethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nº CAS:

52315-07-8

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

25% p/p

FORMULAÇÃO:

Concentrado emulsionável

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides


CLASSE:

Inseticida e formicida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



## APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 1L

## INDICAÇÕES DE USO:

Indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças Traças (*Lepisma saccharina* e *Ephestia sp*).

## MODO DE APLICAÇÃO:

CIPERPRAG® 250 CE é indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças. Pode ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) e pulverização ultra baixo volume (UBV). Aplicar em fendas, frestas, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos e outros locais que sirvam de abrigo para as pragas. Aplique somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo:

ALVO	MODO DE APLICAÇÃO	CALDA (PRODUTO COMERCIAL /	ÁREA TRATADA
Baratas	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m <sup>2</sup>
Moscas	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m <sup>2</sup>
Traças ( <i>Lepisma saccharina</i> e <i>Ephestia sp</i> )	Pulv.	30 ml / 10 L de água	200m <sup>2</sup>
Formigas	Pulv.	50 ml / 10 L de água	200m <sup>2</sup>
Mosquitos ( <i>Aedes aegypti</i> )	Pulv.	20 ml / 10 L de água	200m <sup>2</sup>
Moscas e Mosquitos ( <i>Aedes aegypti</i> )	FOG	15 ml / 1 L de óleo Mineral	5.000m <sup>2</sup>
Moscas e Mosquitos ( <i>Aedes aegypti</i> )	UBV	30 ml / 1 L de água	20.000m <sup>2</sup>

Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. FOG e UBV: 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Pulverização: Adultos - 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Crianças e animais domésticos - 12 horas após a aplicação do produto.

## INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

**Grupo Químico:** Piretróides  
**Nome Comum:** Cipermetrina  
**Antídoto:** Anti-histamínicos  
**Telefone de Emergência:** 0800-0141149  
**DISQUE INTOXICAÇÃO:** 0800-722-6001

## ADVERTÊNCIAS:

### VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

## TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

### TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

#### **PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:**

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

**Assistência Toxicológica: 0800-014-1149**