

LINHA

SAÚDE AMBIENTAL



CIPERMETRINA HIGH-CIS

MARCA COMERCIAL:

Ciperprag[®] 250 CE

REGISTRO NO MS:

3.1606.0046.001-7

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Cipermetrina (Cypermethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nº CAS:

52315-07-8

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

25% p/p

FORMULAÇÃO:

Concentrado emulsionável

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides


CLASSE:

Inseticida e formicida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 1L

INDICAÇÕES DE USO:

Indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças Traças (*Lepisma saccharina* e *Ephestia sp*).

MODO DE APLICAÇÃO:

CIPERPRAG® 250 CE é indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos, formigas e traças. Pode ser aplicado através de pulverização, termonebulização (FOG) e pulverização ultra baixo volume (UBV). Aplicar em fendas, frestas, rodapés, paredes, recantos, balcões, armários, entulhos e outros locais que sirvam de abrigo para as pragas. Aplique somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda, siga as instruções da tabela abaixo:

| ALVO | MODO DE APLICAÇÃO | CALDA (PRODUTO COMERCIAL / | ÁREA TRATADA |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Baratas | Pulv. | 20 ml / 10 L de água | 200m ² |
| Moscas | Pulv. | 20 ml / 10 L de água | 200m ² |
| Traças (<i>Lepisma saccharina</i> e <i>Ephestia sp</i>) | Pulv. | 30 ml / 10 L de água | 200m ² |
| Formigas | Pulv. | 50 ml / 10 L de água | 200m ² |
| Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) | Pulv. | 20 ml / 10 L de água | 200m ² |
| Moscas e Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) | FOG | 15 ml / 1 L de óleo Mineral | 5.000m ² |
| Moscas e Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) | UBV | 30 ml / 1 L de água | 20.000m ² |

Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. FOG e UBV: 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Pulverização: Adultos - 30 minutos após a aplicação do produto ou o tempo necessário para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Crianças e animais domésticos - 12 horas após a aplicação do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Piretróides
Nome Comum: Cipermetrina
Antídoto: Anti-histamínicos
Telefone de Emergência: 0800-0141149
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

ADVERTÊNCIAS:

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA VENDA LIVRE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149