

RATTEN-RAT® BP

BRODIFACOUM 0,005%



RATICIDA BLOCO



COMPOSIÇÃO:

**Brodifacoum 0,005% p/p,
Benzoato de Denatonio 0,001% p/p,
veículo, solventes, corante, inerte, preservante e atrativos.**

A potência do Brodifacoum agora com tecnologia Alemã

INDICAÇÕES DE USO:

RATTEN-RAT BP é um raticida anticoagulante de dose única, na forma de blocos, indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

MODO DE USO:

RATTEN-RAT BP deve ser aplicado onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc. De acordo com o nível de infestação e tamanho da área a ser tratada, aplicar de 20 a 60 gramas de blocos por ponto de iscagem, a uma distância aproximada de 5 a 10 metros um do outro.

Recomenda-se o uso de caixas porta-iscas para proteger o produto das intempéries e dificultar o acesso de espécies não-alvo ao raticida.

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados regularmente para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

RESTRICÇÕES DE USO:

- Não misture o produto com alimentos ou outras iscas.
- Não aplique o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.

ADVERTÊNCIAS:

- Sempre usar luvas impermeáveis ao manipular o produto.
- Só utilizar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- A limpeza de eventuais resíduos deve ser feita com a utilização de luvas impermeáveis, colocando em saco plástico devidamente fechado e identificado. Manter em local adequado até seu descarte final.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.

Fabricado por:
DETIA FREYBERG GMBH.
Werner Freyberg Str. 11, 69514
Laudenbach - Alemanha. Indústria Alemã.

Fabricado, Importado e Distribuído por:
BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antônio Bernardo, 3950. Pq. Industrial Imigrantes,
São Vicente / SP. CEP: 11349-380.
CNPJ: 58.133.703/0001-78.
Tel.: (13) 3565-1208
www.bequisa.com.br/faleconosco@bequisa.com
Indústria Brasileira.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vanessa S. Pierri Gil.
CRQ nº 04300914 - IV Região.

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Usar luvas, máscara e proteção ocular.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- No caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, botas e luvas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, evitar o uso de solventes.
- Manter a embalagem fechada.
- Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- **Reentrada nas áreas tratadas:** não há restrições quanto à reentrada nos locais tratados.
- **Desativação do produto:** desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.
- **Restos de produto:** manter as eventuais sobras do produto e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
- **Embalagem usada:** o descarte deve ser realizado de acordo com a legislação local. Observe a Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual e Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem enterre as embalagens vazias.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Cumarínico

Nome comum: Brodifacoum

Antídoto: Vitamina K1.

Telefone de emergência: 0800-0141149

DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722.6001

Número de lote: Vide embalagem
Data de Fabricação: Vide embalagem
Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação

Registrado no M.S. sob o nº: 3.1606.0087.001-0

Atendimento ao Consumidor

Assistência Toxicológica  **BEQUISA**
0800-0141149 (13) 3565-1212

7898007892406

CIQUIM 100001212

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO

GUIDADO! VENENO



(100 blocos de 10g)

1kg

PESO LÍQUIDO

RATTEN-RAT BP RODENTICIDA
DOSE ÚNICA É EFICAZ CONTRA
RATOS, RATAZANAS E
CAMUNDONGOS.

DOSE ÚNICA



VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA A VENDA LIVRE

RATICIDA BLOCO

BRODIFACOUM 0,005%

RATTEN-RAT® BP



RATTEN-RAT® BP

BRODIFACOUM 0,005%